



Nirsevimab——父母须知

客户信息册

什么是呼吸道合胞病毒 (RSV) ?

RSV病毒是一种常见的呼吸道病毒,通常会引起轻微的感冒症状,但也可能导致更严重的疾病。

感染RSV病毒可能会出现流涕、食欲减退、咳嗽、打喷嚏、发热或喘息等症状。

RSV病毒易于传播,大多数儿童会在两岁前感染RSV病毒。虽然绝大多数儿童会在一至两周内康复,但RSV病毒感染也可能导致呼吸困难、低血氧和脱水等情况,会对婴儿和低龄儿童造成危险。

在澳大利亚,RSV病毒感染是婴儿住院的最常见原因,因为在低龄儿童群体中,常会发展为肺炎(肺部感染)或支气管炎(肺部小气道的炎症)。在西澳,每年冬天病毒流行季,每30名婴儿中就有一名因RSV病毒住院。

什么是nirsevimab?

Nirsevimab(Beyfortus®)是一种含有抗体的药物,可以预防婴幼儿感染严重的RSV疾病。抗体是身体用来对抗有害病菌的蛋白质。传统的疫苗通过刺激身体产生抗体,从而激发对特定疾病的保护作用。该过程可能需要几周的时间,并且可能需要多次接种疫苗以确保产生足够的抗体来实现保护。与其它疫苗不同,nirsevimab药物含有预制的RSV预防抗体,几乎可以在婴儿接种后立即提供直接保护。

为什么应该为您孩子接种nirsevimab?

Nirsevimab中的抗体可以预防由RSV病毒引发的严重肺病。医学研究显示,nirsevimab对预防婴儿在他们的第一个RSV病毒易感季住院的有效性约为80%,且对预防婴儿进入重症监护室(ICU)的有效性达90%。

哪些群体可接种 nirsevimab?

根据本项目要求,以下四个群体有资格接种nirsevimab。

从2024年4月1日到2024年9月30日,将为指定群体提供nirsevimab接种:

- 作为一项补种计划,适用于在2023年10月1日至2024年4月30日期间出生的婴儿
- 适用于所有在2022年10月1日至2024年9月30日期间出生的原住民孩童
- 对于一些在2022年10月1日至2023年9月30日期间出生的、处于第二个RSV病毒易感季且具有医疗风险的儿童(如果您孩子需要接种,医生会给您建议)。

此外:

- 所有在2024年5月1日至9月30日期间出生的婴儿将在出生时接种

何时是为您孩子接种RSV疫苗的最佳时间?

一剂量的nirsevimab可以至少在5个月内给婴儿提供保护,约等于RSV病毒易感季平均长度。在RSV病毒易感季(通常指西澳的5月至9月)出生的婴儿应在离开出生医院前接种一剂量的nirsevimab。

Nirsevimab能否与其他儿童疫苗同时接种？

Nirsevimab中的RSV预防抗体可以与常规推荐给婴幼儿的疫苗同时接种。

这次免疫接种将记录在哪里？

您孩子接种了nirsevimab后，将记录在澳大利亚免疫登记册(AIR)上。您可以通过登录到您的Medicare在线账户，在MyGov (www.my.gov.au)上访问您孩子的AIR报告。(如果您还没有myGov账户，您需要先创建一个，并将其链接到Medicare)。

接种nirsevimab的风险有哪些？

在临床试验中，大多数接种nirsevimab的婴儿没有不良反应。虽然不常见，但最常报告的副作用是注射部位的红肿、触痛或低热及皮疹。几乎所有反应都是轻微的，通常在几天内就会消失。如需要，您可以拨打Healthdirect电话1800 022 222 (24小时)寻求非紧急的药物副作用管理建议。

尽管在nirsevimab的研究中观察到的副作用发生率较低，但与其他所有药物一样，服用药物后有极小的可能性会发生严重的过敏反应，明白这一点很重要。进行免疫接种的诊所应已配备齐全，可应对可能发生的非常罕见却较严重的过敏反应。父母也应注意，过敏反应可能在您孩子离开医院或诊所后出现。如果您发现孩子出现严重过敏反应迹象(例如荨麻疹，面部和喉咙肿胀，呼吸困难，心跳加快，头晕或虚弱)，请拨打000并将您孩子送到最近的医院。

本文件提供多种形式以供选择。

传染病控制局制作
© 卫生厅2024年

除非另有说明，否则此文件材料的版权归西澳政府所有。根据《1968年版权法》的规定，除独立研究、研究、评审或评论等正经用途外，未经西澳政府的书面许可，任何部分都不得复制或重新使用。

西澳卫生厅是否监测免疫接种的安全性？

是的。西澳疫苗安全监测系统(WAVSS)是西澳的政府管理的服务系统，负责包括nirsevimab在内的任何免疫接种后的不良反应事件。如果您孩子在接种疫苗后出现任何令人担忧的副作用，请发送报告

- 至www.safevac.org.au/Home/Info/WA网站或
- 拨打WAVSS的电话：(08) 6456 0208 (周一至周五上午8:30至下午4:30)

在接种前，我应该告知孩子的医疗服务提供者什么信息？

如果您孩子曾出现以下情况，请告知医疗服务提供者：

- 曾对含有抗体的药物剂量产生过严重的过敏反应
- 患有出血性疾病
- 目前正患有中度或重度疾病。

患有轻微疾病(如感冒)的儿童可以安全接种RSV疫苗。中度或重度病患儿童通常应等到康复后再接种。您的医疗服务提供者可为您提供更多信息，以便为孩子做出最佳选择。

如何了解更多信息？

- 咨询您的医疗服务提供者
- 访问www.healthywa.wa.gov.au/rsv网站

